

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам
протокол от «13» мая 2020 г. № 108

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины поливалентной против колибактериоза телят и ягнят

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Вакцина поливалентная против колибактериоза телят и ягнят.
- 1.2 Вакцина представляет собой инаktivированную взвесь штаммов эшерихий (*Escherichia coli* O20, O117, O26, O139, O15, O41, O55, O115, O101, O141, O8, O9, O78).
- 1.3 По внешнему виду вакцина представляет собой жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с осадком от серо-белого до светло-коричневого цвета, легко разбивающимся при встряхивании в гомогенную взвесь.
- 1.4 Вакцину упаковывают в стерильные стеклянные флаконы по 50,0; 100,0 и 200,0 см³. Флаконы с вакциной укупоривают резиновыми пробками и обкатывают металлическими колпачками.
- 1.5 Вакцину хранят в упаковке изготовителя в защищенном от света месте при температуре от плюс 2 °С до плюс 8 °С.
- 1.6 Срок годности вакцины 1 год с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. Неиспользованные остатки вакцины хранению не подлежат.

2 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Вакцина в своем составе содержит антигенные комплексы вакцинных штаммов эшерихий, инаktivированные формалином и сорбированные гидроокисью алюминия. Комплексы антигенов вызывают выработку специфических антител, которые обеспечивают иммунитет против возбудителей колибактериоза.
- 2.2 Иммунитет формируется через 18-20 суток после введения первой дозы вакцины и сохраняется у взрослых животных в течение 5-6, у молодняка 3-4 месяцев.
- 2.3 Вакцина безвредная и ареактогенная. Лечебными свойствами не обладает.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- 3.1 Вакцину применяют в хозяйствах, неблагополучных по колибактериозу, для профилактики колибактериоза у телят и ягнят.
- 3.2 Вакцинируют беременных животных за 1,5 - 2 месяца до родов, а также ягнят перед отъемом.
- 3.3 Перед применением и в процессе применения флаконы с вакциной встряхивают до образования однородной взвеси, а в холодное время года – подогревают на водяной бане до температуры (36-38) °С.
- 3.4 Перед вакцинацией проводят клинический осмотр поголовья и вакцинируют только клинически здоровых животных. Вакцинации не подлежат животные с повышенной температурой тела, с признаками истощения или каких-либо заболеваний. Не допускается применение вакцины в хозяйствах, неблагополучных по остроинфекционным заболеваниям до ликвидации этих заболеваний.
- 3.5 При вакцинации необходимо соблюдать правила асептики и антисептики. Перед применением вакцины шприцы, иглы стерилизуют кипячением и для каждого животного используют отдельную иглу, кожу на месте введения вакцины обрабатывают антисептическим средством, разрешенным к применению.
- 3.6 Вакцину вводят внутримышечно в область шеи двукратно с интервалом 10-15 суток с учетом состояния и массы животных в дозах, указанных в таблице.

Таблица – Дозы применения вакцины

Вид животных	Дозы вакцины (см ³)	
	Первая вакцинация	Вторая вакцинация
Крупный рогатый скот	10-15	10-15
Овцы	3-4	4-5
Ягнята (перед отъемом)	1-1,5	1,5-2,0

3.7 В периоды вакцинации не допускается дегельминтизация в течение 7 суток до вакцинации и 10-14 суток после нее.

3.8 Реакция на введение вакцины у взрослых животных и молодняка наступает обычно через 1-2 часа и выражается кратковременным повышением температуры тела на 0,5-1,5 °С, угнетением и снижением аппетита. Эта реакция обычно проходит без лечебного вмешательства. На месте введения вакцины возможна местная реакция в виде незначительной припухлости, исчезающей в течение 4-10 суток.

3.9 Вакцину используют в день вскрытия флакона. Неиспользованная вакцина специального обезвреживания не требует, не представляет опасности для животных, человека и окружающей среды.

3.10 Убой животных на мясо после применения вакцины разрешается без ограничений.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с вакциной следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными препаратами.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения вакцины, ее использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению вакцины в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 ОАО «БелВитунифарм»

211309, д. Должа, ул. Советская д. 26А, Витебский р-н и обл., Республика Беларусь.

Инструкция по применению разработана специалистами ОАО «БелВитунифарм» (Шашкова Ю.А.).

